arXiv:1103.3246v1 [math.GR] 16 Mar 2011

Cyclically regular semigroups

S. Kublanovsky

February 11, 2008

TPO "Severnyi ochag"
30, B.Konjushennaja 15
191186, St.Petersburg, Russia
E-mail: stas@norths.spb.su

Аннотация

We study varieties of semigroups related to completely 0-simple semigroup. We present here an algorithmic descriptions of these varieties interms of "forbidden" semigroups.

Keywords: semigroup, completely 0-simple semigroup, identity, variety, pseudovariety, finite basis property, membership problem, polynomial algorithm, cyclically regular semigroup.

Содержание

1 Введение **2**

2 Определения и обозначения **2**

3 Вспомогательные утверждения **4**

4 Основные результаты **7**

1 Введение

Понятие регулярности, введенное Фон-Нейманом в 1936 г., играет важную роль в теории полугрупп и колец. Здесь мы вводим понятие циклической регулярности. Полугруппу S назовем *циклически регулярной*, если каждый ее циклический элемент регулярен. Элемент b называется *циклическим*, если $b = axa$ для некоторых a из S и x из S^1. Потребность такого обобщения вызвана тем обстоятельством, что многообразие, порожденное тем или иным классом регулярных полугрупп, может не состоять из регулярных полугрупп. Однако, при переходе к многообразиям в ряде случаев сохраняется свойство циклической регулярности. Это факт имеет место для 0-простых периодических полугрупп, ограниченной экспоненты. В этой заметке мы исследуем свойства циклически регулярных полугрупп и связанных с ними многообразий.

2 Определения и обозначения

Пусть X - некоторое непустое множетво. Его элементы будем называть *буквами*, а само множество - *алфавитом. Словом* над X назовем любую конечную последовательность букв. Через S_X обозначим полугруппу всех слов над X с операцией приписывания.

Слово u называется *повторным*, если каждая буква в нем встречается более одного раза; слово u называется *сингулярным*, если каждая буква встречается в нем только один раз.

Подслово $u^{'}$ слова u называется *циклическим* (или *циклом*), если $\left|u^{'}\right| \geq 2$ и $l_1\left(u^{'}\right) \equiv r_1\left(u^{'}\right)$. Слово u называется *покрытым циклами*, если каждая его буква входит в некоторое циклическое подслово слова u . Ясно, что каждое повторное слово покрыто циклами и произведение слов $u \equiv u_1 u_2 \cdots u_m$, покрытых циклами, само покрыто циклами. Напомним, что через $l_k(w)$ ($r_k(w)$) обозначается k-я слева (справа) буква слова w, а через $|w|$ обозначается количество букв в слове w.

Буква t слова u называется *блокирующей*, если это слово имеет вид $u \equiv u_1 t u_2$, причем $t|u_1, t|u_2, u_1|u_2$. Запись $v|w$ означает, что слова v и w не имеют общих букв. Знак $\equiv$ используется для обозначения совпадающих слов, а знак $=$ - для обозначения равных элементов в полугруппах. Отметим, что слово не содержит блокирующих букв тогда и только тогда, когда оно покрывается циклами.

На последовательности букв любого слова $u \equiv a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n}$ можно определить отношение $\sim$ такое, что: $a_{i_k} \sim a_{i_l}$, если буквы a_{i_k}, a_{i_l} входят в некоторый подцикл слова u или $k = l$. Транзитивное замыкание $\sim^t$ является эквивалентностью, которая разбивает слово u на подслова $u \equiv u_1 u_2 \cdots u_m$, состоящие из эквивалентных букв. Ясно, что $u_i|u_j$ для любых $i \neq j$. Такое представление слова будем называть *общим каноническим разложением.*

Количество компонент m в каноническом разложении слова u будем

называть *общей циклической характеристикой* слова и обозначать $m_c(u)$. Если $m_c(u) = 1$ и $|u| > 1$, то слово u будем называть *регулярным.* Легко видеть, что слово u регулярно тогда и только тогда, когда его длина больше 1 и каждое его двухбуквенное подслово содержится в некотором подцикле.

Ясно, что слово покрывается циклами тогда и только тогда, когда $|u_i| \geq 2$ для всех i. Также отметим, что если $|u_i| > 1$ для некоторого i, то u_i - регулярное слово.

Если какая нибудь буква x встречается в слове u несколько раз, то все ее вхождения попадают в одну компоненту u_i ее каконического разложения. Номер i этой компоненты будем называть циклическим номером буквы x в слове u и обозначать $N_u(x)$.

На множестве всех букв слова u определяются два бинарных отношения e_u и $\leq_u$ определённые следующим образом:

$$xe_uy \text{ тогда и только тогда, когда } N_u(x) = N_u(y)$$
$$x \leq_u y \text{ тогда и только тогда, когда } N_u(x) \leq N_u(y).$$

Два слова u, v называются *гомогенными*, если они состоят из одних и тех же букв. Два слова $u \equiv u_1u_2 \cdots u_{m_c(u)}, v \equiv v_1v_2 \cdots v_{m_c(v)}$ называются *подобными*, если выполнены следующие три условия:

- циклические характеристики слов u, v равны, то есть $m_c(u) = m_c(v)$;
- соответствующие компоненты u_i и v_i являются гомогенными;
- если $|u_i| = 1$, то и $|v_i| = 1$ (и наоборот).

Нетрудно видеть, что, если слова u, v подобны, то $e_u = e_v$ и $\leq_u = \leq_v$.

Мы также будем пользоваться следующей четырехэлементной полугруппой, заданной определяющими соотношениями следующим образом:

$$A_0 = \langle a, b \mid a^2 = a, b^2 = b, ba = 0 \rangle.$$

Если S - некоторая полугруппа, то через rS обозначается множество регулярных элементов S.

Полугруппа S называется *регулярно замкнутой,* если произведение регулярных элементов является регулярным элементом, другими словами, если rS - подполугруппа S. Стоит отметить, что не каждая полугруппа является регулярно замкнутой (например, A_0). Но тем не менее A_0 - циклически регулярная полугруппа (но не регулярная).

Однако, известно, если S - ортодоксальная (то есть произведение любых идемпотентов S являтся идемпотентом), то S регулярно замкнута. Действительно, пусть $a = axa, b = byb$ для некоторых элементов a, b, x, y из S. Тогда xa, by - идемпотенты. Поэтому $xa \cdot by$ - тоже идемпотент. Получим $a \cdot b = axa \cdot byb = a(xa \cdot by)b = a(xa \cdot by)(xa \cdot by)b = = (axa)(byxa)(byb)$, откуда $ab = abyxab$

Если S - некоторая полугруппа, то через $I(a)$ обозначается главный идеал, порожденный элементом a, то есть $I(a) = S^1aS^1$.

3 Вспомогательные утверждения

Лемма 1. *Если в полугруппе S для некоторого натурального n выполняются тождества*

$$x^2 = x^{n+2} \tag{1}$$

$$xyx = (xy)^{n+1}x \tag{2}$$

то S - циклически регулярная полугруппа.

Доказательство. Вытекает из определений. □

Лемма 2. *Пусть S - циклически регулярная полугруппа, a, e, f, w - элементы S. Если e, f - идемпотенты и принадлежат главному идеалу $I(a)$, а также имеет место равенство $w = ew = wf$, то w - регулярный элемент.*

Доказательство. По условию идемпотенты e, f принадлежат $I(a)$. Поэтому $e = e_1ae_2$, $f = f_1af_2$. Без ограничения общности можно считать $e_{1,2}, f_{1,2}$ непустыми символами (в противном случае равенства $e = e_1ae_2$, $f = f_1af_2$ можно слева и справа домножить соответственно на e и f). Получим, $w = ewf = e_1ae_2 \cdot w \cdot f_1af_2 = e_1(ae_2w \cdot f_1a)z(ae_2w \cdot f_1a)f_2 = ew(f_1azae_2)wf$, откуда $w = w(f_1azae_2)w$. □

Предложение 1. *Главные иделы в циклически регулярной полугруппе регулярно замкнуты.*

Доказательство. Пусть S - циклически регулярная полугруппа, a - элемент S. Пусть b, c - регулярные элементы $I(a)$. Докажем, что bc - регулярный элемент в полугруппе $I(a)$. По условию $b = bxb, c = cyc$ для некоторых x, y из $I(a)$. Пусть $e = bx, f = yc$. Ясно, что e, f - идемпотенты и принадлежат $I(a)$. С другой стороны, $e \cdot bc = bxbc = bc$, $bc \cdot f = bcyc = bc$. По лемме 2 $w = bc$ - регулярный элемент S. Это означает, что $bc = bczbc$ для некоторого z из S. Тогда $bc = bc \cdot z^{\#}bc$, где $z^{\#} = zbcz$ принадлежит $I(a)$ Это означает, что bc - регулярный элемент в $I(a)$. □

Предложение 2. *Пусть S - произвольная циклически регулярная полугруппа. Если w - произвольное регулярное слово, то w - регулярный элемент S (имеется ввиду значение w при любой подстановке значений букв из S).*

Доказательство. В дальнейшем слово будем называть *хорошим*, если его значение при любой подстановке значений букв из S является регулярным элементом. Требуется доказать, что любое регулярное слово w является хорошим. Так как w - регулярное слово, то $|w| > 1$ по определению. Пусть $x = l_1(w)$, $y = l_2(w)$. Так как w - регулярное слово, то первая и вторая буквы этого слова должны войти в некоторый цикл $w^{'} \leq w$, тогда $u \equiv w'w''$, где w'' - некоторое слово или пустой символ. По условию, $w^{'}$ - хорошее слово.

Пусть слово w представимо в виде $w \equiv u \cdot v$, где u - хорошее слово, а v - слово или пустой символ. Причем, слово u имеет наибольшую возможную длину. Если $w \equiv u$, то w - регулярный элемент S, то есть w - хорошее слово.

Пусть $w \not\equiv u$. Пусть y - последняя буква в слове u; z - первая буква в слове v. Если слова u, v не имеют общих букв, то y и z не связаны отношением $\sim^t$ в слове w , то есть w - не регулярное слово (так как нет ни одного цикла с началом в u и концом в v). Значит, слова u и v имеют общую букву. Пусть z - общая буква слов u и v. Тогда $u \equiv u_1 z u_2$; $v \equiv v_1 z v_2$, для некоторых слов $u_{1,2}$ и $v_{1,2}$. Рассмотрим слово $u^{\#} \equiv u_1 z u_2 v_1 z$. Покажем, что $u^{\#}$ - хорошее слово. Зафиксируем какую-нибудь подстановку букв слова w в полугруппу S. По предположению, значение слова u - регулярный элемент в полугруппе S, то есть в этой полугруппе $u = uau$ (для некоторого a , принадлежащего S). Здесь и далее значение любого слова (подслова слова w) при фиксированной выше подстановке букв и само слово будут обозначаться одинаково, а знак $=$ будет использоваться для обозначения равных элементов в полугруппе S.

Обозначим в полугруппе S элемент ua через e , то есть $e = ua = u_1 z u_2 a$. Тогда $eu^{\#} = eu_1 z u_2 v_1 z = euv_1 z = uauv_1 z = uv_1 z = u_1 z u_2 v_1 z = u^{\#}$. По условию, $z u_2 v_1 z$ - регулярный элемент в S, то есть $z u_2 v_1 z = (z u_2 v_1 z)\, b\, (z u_2 v_1 z)$, для некоторого элемента b из S. Обозначим через $f = b z u_2 v z_1$. Тогда:

$$u^{\#} f = (u_1 z u_2 v_1 z)\, b z u_2 v z_1 = u_1 (z u_2 v_1 z)\, b\, (z u_2 v_1 z) =$$

$$= u_1 (z u_2 v_1 z) = u^{\#}.$$

Так как элементы e и f имеют в полугруппе S общий делитель z , то они принадлежат идеалу $I(z)$. По Лемме 2, $u^{\#}$ - регулярный элемент S. Следовательно, слово $u^{\#}$ - хорошее. Но, так как $w = uv = u_1 z u_2 v_1 z v_2 = u^{\#} v_2$ и $\left|u^{\#}\right| > |u|$, то получаем противоречие с предположением, что длина слова u - наибольшая из возможных. Следовательно, случай $w \not\equiv u$ невозможен. $\square$

Следствие 1. *Значения регулярных слов в полугруппе являются регулярными элементами тогда и только тогда, когда эта полугруппа циклически регулярна.*

Лемма 3. *Если u - регулярное слово, то при любом эндоморфизме f : $S_X \to S_X$ образ u^f - регулярное слово (здесь и далее образ $f(u)$ слова u обозначается через u^f).*

Доказательство. Достаточно доказать, что любые две смежные буквы в слове u^f принадлежат некоторому его подциклу. Итак, пусть xy - двухбуквенное подслово u^f. Возможны два случая:

1. xy - подслово слова c^f для некоторой буквы c слова u. Поскольку регулярное слово покрывается циклами, то буква c входит в некоторый подцикл $u^{'}$ слова u .

2. $x = r_1\left(a^f\right), y = l_1\left(b^f\right)$ для некоторого ab - двухбуквенного подслова u. Тогда слово ab входит в некоторый подцикл $u^{'}$ слова u.

Итак, в любом из возможных случаев мы приходим к некоторому подслову $u^{'}$ слова u , являющемуся циклом, причем двухбуквенное слово xy является подсловом слова $(u')^f$. Пусть $u' = xu^{\#}x$, $x^f = a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_n}$, тогда $\left(u^{'}\right)^f = a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_n}\left(u^{\#}\right)^f a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_n}$. Легко видеть, что любые две смежные буквы слова $\left(u^{'}\right)^f$ входят в некоторый подцикл. В частности, это верно и для букв x, y. Итак, любые две смежные буквы слова u^f принадлежат некоторому подциклу. Следовательно, u^f - регулярное слово. □

Предложение 3. *Если слова u и v подобны, то тождество $u = v$ выполняеся в полугруппе A_0.*

Доказательство. Предположим, что слова u и v подобны. Зафиксируем какую-нибудь подстановку f из алфавита X в полугруппу A_0. По определению слова u, v должны иметь вид: $u = u_1u_2\cdots u_m$, $v = v_1v_2\cdots v_m$, причем, соответствующие компоненты u_i и v_i являются гомогенными. Также, на основании определения, если $|u_i| = 1$, то и $|v_i| = 1$ (и наоборот) для всех $i = 1, 2, \cdots, m$. Рассмотрим возможные случаи.

1. $|u_i| > 1$. В таком случае $|v_i| > 1$. Слова u_i, v_i являются регулярными (по определению канонического разложения слова). По предложению 2, в любой циклически регулярной полугруппе значения регулярных слов являются регулярными элементами. Легко заметить, что полугруппа A_0 - циклически регулярная. Действительно, эта полугруппа состоит из четырех элементов $a, b, z = ab$ и 0 и может быть задана таблицей Кэли: $A_0 = \{a, b, z, 0 \mid a^2 = a, b^2 = b, ab = az = zb = z\}$. Неуказанные произведения считаются равными нулю. Нетрудно убедиться, что в этой полугруппе выполняются тождества (1) и (2) для $n = 1$. По лемме 1 заключаем, что A_0 - циклически регулярная полугруппа. Поэтому значения слов u_i и v_i должны быть регулярными элементами в полугруппе A_0. Следует отметить, что, если при рассматриваемой фиксированной подстановке значение хотя бы одной буквы d из u_i равно z , то значение всего слова u_i обязано равняться 0 . Действительно, поскольку u_i - регулярное слово, то оно должно иметь вид $u \equiv w_1cw_2dw_3cw_4$ для некоторой буквы c и некоторых слов $w_{1,2,3.4}$ (возможно пустых). Тогда $f(u) = f(w_1)f(c)f(w_2)zf(w_3)f(c)f(w_4) = 0$. Это же утверждение имеет место и для слова w_i. Регулярными элементами в полугруппе A_0 являются только $a, b, 0$. Если значение слова u_i равно a, то значение всех букв слова u_i равно a. Тогда значение всех букв слова v_i тоже равно a, поскольку слова u_i, v_i состоят из одинаковых букв. Если значение слова u_i равно b, то значение всех букв слова u_i равно b. Тогда значение всех букв слова v_i тоже равно b, поскольку слова u_i, v_i состоят из одинаковых букв. Если значение слова u_i равно b, то значение всех букв слова u_i равно b. Тогда значение всех букв слова v_i тоже равно b, поскольку слова u_i, v_i состоят из одинаковых букв. Если значение слова u_i равно 0 , то возможно два случая:

(a) значение одной из букв слова u_i равно 0;

(b) значение ни одной из букв слова u_i не равно 0.

Если имеет место случай 1a, то значение слова v_i равно 0, поскольку слова u_i, v_i состоят из одинаковых букв.

Пусть имеет место случай 1b. Если значение хотя бы из одной букв слова u_i равно z, то, как отмечалось выше, значения слов u_i и v_i равны 0, поскольку эти слова состоят из одинаковых букв. Осталось рассмотреть ситуацию, при которой значения букв слов u_i равны либо a, либо b, причем в состав слова $f(u_i) = u_i(a,b)$ обязательно входят буквы a и b. Тогда значение слова v_i равно $f(v_i) = v_i(a,b)$, причем в состав слова $v_i(a,b)$ входят буквы a и b. Поскольку $f(v_i) = v_i(a,b)$ - регулярный элемент, то $v_i(a,b) = v_i(a,b)\, v^{\#} v_i(a,b)$ для некоторого элемента $v^{\#}$ из A_0. Если $v^{\#} = 0$, то $v_i(a,b) = 0 = u$. Если $v^{\#} \neq 0$, то $v^{\#} = v^{\#}(a,b)$ - слово от элементов a, b. Заключаем, $v_i(a,b) = v_i(a,b)\, v^{\#} v_i(a,b) = v_i(a,b)\, v^{\#}(a,b)\, v_i(a,b)$ содержит подслово ba. Это означает, что $v_i(a,b) = 0 = u_i(a,b)$. Итак получаем, что значения слов u_i и v_i совпадают (при любой подстановке элементов A_0 вместо букв). Это означает, что в полугруппе A_0 выполняется тождество $u_i = v_i$.

2. $|u_i| = 1$. Тогда $|v_i| = 1$ (по определению подобных слов). Поскольку слова u_i, v_i гомогенные, заключаем, $u_i = v_i$ - одинаковые буквы. Итак, во всех возможных случаях в полугруппе A_0 выполняется тождество $u_i = v_i$.

Откуда следует, что в полугруппе A_0 выполняется тождество $u = v$. □

4 Основные результаты

В следущей теореме используются семь конечных полугрупп из работы автора [2], заданных определяющими соотношениями:
$A = \langle x, y \mid x = x^2; y^2 = 0; xy = yx \rangle$,
$B = \langle x, y \mid x^2 = 0; y^2 = 0; xyx = yxy \rangle$,
$C_\lambda = \langle x, y \mid x^2 = x^3; xy = y; yx^2 = 0; y^2 = 0 \rangle$,
$C_\rho = \langle x, y \mid x^2 = x^3; yx = y; x^2y = 0; y^2 = 0 \rangle$,
$N_3 = \langle x \mid x^3 = 0 \rangle$,
$D = \langle x, y \mid x^2 = 0; y = y^2; yxy = 0 \rangle$,
$K_n = \langle x, y \mid x^2 = 0; y^2 = y^{n+2}; yxy = 0; xy^q x = 0, (q = 2, \cdots, n); xyx = xy^{n+1}x \rangle$.

Теорема 1. *Для многообразия полугрупп V следующие войства эквивалентны.*

1. *Все полугруппы многообразия V циклически регулярны.*

2. *В многообразии V выполняются тождества* (1) *и* (2) *для некоторого натурального числа n.*

3. *V не содержит ни одной из конечных полугрупп A, B, C_λ, C_ρ, N_3, D и K_n.*

Доказательство. Следует из леммы 1 и леммы 10 из работы [2]. Достаточно проверить, что перечисленные выше конечные полугруппы не являются циклически регулярными. □

Следствие 2. *Если конечные полугруппы многообразия являются циклически регулярными, то и все полугруппы этого многообразия являются циклически регулярными.*

Следствие 3. *Существует алгорит полиномиальной сложности, определяющий по конечному базису тождеств многообразия, все ли его полугруппы являются циклически регулярными.*

Доказательство. Следует из теремы 1 и того факта, что проверка выполнимости тождеств на полугруппах (1) – (7) имеет полиномиальную сложность (см. [1]). □

Теорема 2. *Для многообразия полугрупп V следующие свойства эквивалентны.*

1. *Все полугруппы многообразия V регулярно замкнуты.*
2. *Среди тождеств базиса многообразия V есть тождество $u = v$, у которого слова u, v не подобны.*
3. *В многообразии V выполняется тождество вида $x^n y^n = uyxv$, где x, y -буквы, а u, v - слова (возможно пустые).*
4. *Многообразие V не содержит полугруппы A_0.*

Доказательство. 1⇒2. Предположим, все полугруппы многообразия V регулярно замкнуты, но все тождества $u = v$ базиза, которым задается V, состоят из подобных слов. В этом случае A_0 принадлежит многообразию V по предложению 3. Но полугруппа A_0 не является регулярно замкнутой, т.к. произведение регулярных элементов $a \cdot b$ не является регулярным элементом. Противоречит предположению.

2⇒3. Пусть среди тождеств базиса многообразия V выполняется тождество $u = v$, у которого слова u, v не подобны. Это возможно в одном из четырех случаев:

1. u, v - не гомогенные слова;
2. u, v - гомогенные слова, но $e_u \neq e_v$;
3. u, v - гомогенные слова, $e_u = e_v$, но $\leq_u \neq \leq_v$;
4. u, v - гомогенные слова, $e_u = e_v$, $\leq_u = \leq_v$, причем, для некоторого i слова u_i и v_i имеют вид $u_i = z, v_i = z^k$ для некоторой буквы z и натурального числа $k > 1$.

В первом случае 1, получаем, что в качестве следствия тождества $u = v$ можно получить тождество вида $u^{\#}yv^{\#} = x^n$. Подставляя вместо $y \mapsto xy$ и умножая справа полученное тождество на y^n, получим в качестве следствия тождество вида $x^n y^n = uyxv$.

Во втором случае 2 получаем, что существует пара различных букв x, y , для которой $N_u(x) \neq N_u(y)$, но $N_v(x) = N_v(y)$ (или наоборот). Пусть для определенности $N_u(x) < N_u(y)$. Рассмотрим отображение $F : X_u \to X_u$ (где X_u - множество букв в слове u), определенное правилом

$$f(z) = \begin{cases} x & \text{если } N_u(z) \leq N_u(x); \\ y & \text{если } N_u(z) > N_u(x). \end{cases}$$

Заметим, что $f(x) = x, f(y) = y$. Тогда $u^f = u_1^f u_2^f .. u_m^f = x^k y^l$. Поскольку $N_v(x) = N_v(y)$, то буквы x, y лежат в одной компоненте v_i канонического разложения слова $v = v_1..v_i..v_m$. По определению v_i - регулярное слово. Получим, $v^f = (v_1..)^f .v_i^f (..v_m)^f = v^{'}.v_i^f \cdot v^{''}$. Отметим, что $v^{'}, v_i^f, v^{''}$ - слова от букв x, y, причем, буквы x, y присутствуют в слове v_i^f. По лемме 3, v_i^f - регулярное слово (как образ регулярного) от переменых x, y. Заключаем, что слово yx - подслово v_i^f. В противном случае слово $v_i^f = x^p y^q$ не является регулярным. Вывод: следствием тождества $u = v$ является тождество вида $x^k y^l = u^{\#}yxv^{\#}$.

В третьем случае 3, получаем, что существует пара различных букв x, y , для которой $N_u(x) < N_u(y)$, но $N_v(x) > N_v(y)$ (или наоборот). Рассмотрим отображение $F : X_u \to X_u$ (где X_u - множество букв в слове u), определенное правилом

$$f(z) = \begin{cases} x & \text{если } N_u(z) \leq N_u(x); \\ y & \text{если } N_u(z) > N_u(x). \end{cases}$$

Заметим, что $f(x) = x, f(y) = y$. Тогда $u^f = u_1^f u_2^f .. u_m^f = x^k y^l$, $v^f = v^{'} y v^{''} x v^{'''}$. Вывод: следствием тождества $u = v$ является тождество вида $x^k y^l = u^{\#}yxv^{\#}$.

В четвёртом случае 4, рассмотрим отображение $F :: X_u \to X_u$ (где X_u - множество букв в слове u), определенное правилом

$$f(t) = \begin{cases} x & \text{если } N_u(t) \leq i \\ y & \text{если } N_u(t) > i \\ xy & \text{если } t = z. \end{cases}$$

Тогда $u^f = u_1^f u_2^f .. u_m^f = x^k y^l$, $v^f = v^{'} y v^{''} x v^{'''}$. Вывод: и в этом случае следствием тождества $u = v$ является тождество вида $x^k y^l = u^{\#}yxv^{\#}$.

3⇒4. Достаточно показать, что тождество вида $x^n y^n = uyxv$ не выполняется в полугруппе A_0. Действительно, при подстановке $x \to a, y \to b$ значение левой части равно ab, а значение правой части равно 0.

3⇒1. Пусть в многообразии V выполняется тождество вида $x^n y^n = uyxv$. Пусть a, b - регулярные элементы некоторой полугруппы S из V. Имеем $a = aa^{'}a, b = bb^{'}b$ для некоторых $a^{'}, b^{'}$ из S. Пусть $e = a^{'}a, f = bb^{'}$. Ясно, что e, f - идемпотенты полугруппы S. При подстановке $x \to e; y \to f$ в тождесво $x^n y^n = uyxv$ получим равенство $ef = cfed$ в полугруппе S для некотрых элементов c, d из S, причем, $c = c(e, f), d = d(e, f)$ - это выражения от элементов e, f или пустые символы. Откуда $ef = ec(e, f) fed(e, f) f = efwef$ для некоторого элемента w из S. Далее, $ab = aa^{'}a \cdot bb^{'}b = a\left(a^{'}a \cdot bb^{'}\right) w \left(a^{'}a \cdot bb^{'}\right) b = ab\left(b^{'}wa^{'}\right) ab$. Следовательно, ab - регулярный элемент.

4⇒1. Пусть многообразие V не содежит полугруппы A_0. Предположим, что у всех тождеств $u = v$ из базиса, слова u, v - подобные. По предложению 3, A_0 принадлежит многообразию V. Противоречение. □

Следствие 4. *Существует алгоритм линейной сложности (от входных данных), определяющий регулярную замкнутость всех полугрупп многообразия, заданного конечным набором тождеств.*

Следствие 5. *Тождество $u = v$ выполняется на полугруппе A_0 тогда и только тогда ,когда слова u, v подобны.*

Список литературы

[1] S. Bakulin, *On identities of indicator Burnside semigroups*, arXiv:1009.2337v1 [math.GR].

[2] S. Kublanovsky, *On the Rees—Sushkevich variety*, arXiv:1009.2982v1 [math.GR].